

**Beiträge
zur Casuistik der Wunden infolge von
Menschenbiss.**

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe.

Unter dem Präsidium

des

Herrn Geheimen Rath

PROF. DR. VON NUSSBAUM

Generalstabsarzt à la suite

der

hohen medicinischen Facultät zu München

vorgelegt

von

Friedrich Jungkunz

approb. Arzt aus Regensburg.

München, 1884.

KGL. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREI VON DR. C. WOLF & SOHN.

Beiträge
zur Casuistik der Wunden infolge von
Menschenbiss.

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe.

Unter dem Präsidium

des

Herrn Geheimen Rath

PROF. DR. VON NUSSBAUM

Generalstabsarzt à la suite

der

hohen medicinischen Facultät zu München

vorgelegt

von

Friedrich Jungkunz

approb. Arzt aus Regensburg.

München, 1884.

KGL. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREI VON DR. C. WOLF & SOHN.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Seinen lieben Eltern

in dankbarer Verehrung

gewidmet

vom

Verfasser.

Wir stehen zwar lange nicht mehr auf dem Standpunkt, daß wir den Wunden, welche ein Mensch einem andern Menschen mittelst seiner Zähne zufügt, eine durch ein eigentümliches Virus bedingte Gefährlichkeit und Bösartigkeit des Verlaufes zuschreiben und aus diesem Grunde jeden hieher gehörigen Fall der Oeffentlichkeit übergeben, aber ich glaube dennoch, daß auch ohne diese Spezificität derartige Verletzungen bei ihrem immerhin nicht häufigen Vorkommen ein gewisses Interesse bieten. So habe ich mir denn erlaubt einige Fälle von Menschenbisswunden, welche ich in der chirurgischen Poliklinik des Herren Professor Dr. H. Helferich zu beobachten die Gelegenheit hatte, zu beschreiben; denselben fügte ich dann eine Anzahl älterer aus der mir zugänglichen Literatur gesammelte Fälle bei, welche sich sämtlich durch die Schwere ihres Verlaufes auszeichnen und darin mit den jüngst beobachteten im Gegensatz zu stehen scheinen. Diese alten und neuen Fälle nun mit ihren scheinbaren Widersprüchen habe ich unter einen gemeinfamen Gesichtspunkt zu bringen gesucht und sie in ihrem Verlauf, ihren Ausgängen und ihrer Behandlung einer kurzen kritischen Besprechung unterzogen. Der Vollständigkeit halber berücksichtigte ich auch die Lehre vom Zorngift, wenn gleich dieselbe nur mehr vom historischen Standpunkt Interesse gewährt.

Die von mir beobachteten Fälle sind folgende:

I. Fall.

Jahmann Kaspar, 24 Jahre alt, Hausknecht. Patient ein sehr kräftig gebauter und sonst ganz gefunder Mann, geriet in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember 1883 mit einem Unbekannten in Streit. Im Verlauf deselben kam er auf seinen Gegner zu liegen und wurde von diesem heftig in den Mittelfinger seiner linken Hand gebissen. Nachdem er die Wunde mit Schnee abgewaschen hatte, begab er sich am nächsten Tage zu einem Bader in Behandlung, der ihm einen Karbolverband anlegte. Am 2. Tage nach dem Biss stellten sich starke Schmerzen und Schwellung ein, welche letztere sich sowohl in die Hohlhand, als auch auf den Handrücken erstreckte. Da diese Erscheinungen noch zunahmen, kam Patient am 17. Dezember in die chirurgische Poliklinik, wo man folgenden Status konstatieren konnte:

Am Mittelfinger der linken Hand findet sich an der 2. Phalanx eine stark eiternde Wunde, welche sich über die ganze Volarseite parallel der Gelenkfurche erstreckt. Auf der Dorsalseite findet sich der 2. Phalanx entsprechend eine ungefähr haselnussgroße Wunde. Jede Bewegung des Fingers verursacht einen stechenden Schmerz, der sich auf die Mittelhand hinzieht. Der ganze Finger ist sehr stark geschwollen und gerötet und erstreckt sich die Schwellung auch auf die Hohlhand und den Handrücken.

Patient bekam einen feuchten Karbolverband, Hand und Unterarm wurden auf einer gepolsterten Schiene immobilisiert.

Am nächsten Tage hatte die Schwellung und Entzündung sowohl in der Vola als auch am Handrücken zugenommen. Aus der Wunde entleerte sich eine Menge stinkenden Eiters. Dabei hatte Patient starke Schmerzen.

Am 18. wurde Patient narkotisiert und hierauf eine große Incision gemacht, welche sich auf der Volarseite den ganzen Mittelfinger entlang bis 1 cm. in die Hohlhand erstreckte.

Ferner wurde zur Entlastung wegen der kolossalen Schwellung dorfsaitlich von der Strecksehne eine kleinere Incision gemacht. Es ergab sich nun, dass die Weichteile, die Sehnen und das Periost der I. und II. Phalanx nekrotisch waren.

Von der II. Phalanx war ein Teil ungefähr von der Grösse eines Zwanzigpfennigstückes vom Periost entblöst. Das nekrotische Gewebe wurde mit dem scharfen Löffel entfernt. In die Incisionswunden wurde Chlorzink und Jodoformpulver gestreut. Darüber kam ein feuchter Karbolverband. Unterarm und Hand wurden wie bisher auf einer Schiene immobilisiert.

Am Tage nach der Operation war die Handruckschwellung etwas zurückgegangen. Die Schmerzen bestanden noch fort. Im Verlauf der nächsten Tage nahm die Schwellung in der Vola und am Dorsum noch mehr ab und auch die Schmerzen, welche Patienten bisher, besonders nachts, gequält hatten, liessen nach. Der Verband war derselbe geblieben.

Am 30. zeigte die Verletzung folgendes Bild: Der Finger ist ungefähr um das dreifache seiner normalen Grösse verdickt. Die Schwellung der Hand ist nur mehr sehr gering. Die Incisionswunde an der Volarseite des Fingers zeigt in ihrer ganzen Ausdehnung schön hellrothe, üppige Granulationen. Ein kleiner Fistelgang führt in das II. Phalangealgelenk und sieht man den Knochen der II. Phalanx in der Tiefe in der Ausdehnung eines grossen Stecknadelkopfes frei vorliegen. Am Dorsum der II. Phalanx sieht man 2 offene Hautstellen, die spontan, besonders aber auf Druck eine Menge gutartigen Eiters entleeren und allem Anschein nach mit dem Gelenk in Verbindung stehen. Die dorfsaitliche Incisionswunde zeigt gute Granulationen, sie erhält einen einfachen Karbolverband, indes die Volarwunde vorher mit Jodoformpulver bestreut wird. Schiene wie bisher. Patient ist jetzt vollkommen schmerzfrei.

In den ersten Tagen des nächsten Monats, Januar 1884, überwucherten die Granulationen das freiliegende Knochenstück; die dorfsaitliche Incisionswunde begann sich zu überhäuten.

Von den Fistelöffnungen am Dorsum des Fingers aus, kann man nach der Volarseite zu durchspritzen. Die Sekretion der Fisteln ist noch immer beträchtlich. Mitte des Monats ist die dorsale Incisionswunde als geheilt zu betrachten. Die eine Fistelöffnung am Dorsum sezerniert noch, die andere hat sich geschlossen; das Durchspritzen ist nicht mehr möglich, die Volarwunde läßt an beiden Enden und zu beiden Seiten beginnende Ueberhäutung erkennen, während in der Mitte die Granulationen wallartig über das Niveau der Wunde hervorragen; in der Mitte dieses Granulationswalls sieht man einen schwarzen Pfropf hervorstehen, der sich mit der Pinzette leicht und ohne erhebliche Blutung zu verursachen extrahieren läßt und sich als nekrotisches Knochenstück dokumentiert. Das extrahierte Stück ist ungefähr $1\frac{1}{2}$ cm. lang, $\frac{1}{2}$ cm. dick, von unregelmäßig zackiger Oberfläche und schwarzer Farbe. Der Finger ist in toto ziemlich abgeschwollen. Streckbewegung ist aktiv und passiv in geringem Grade möglich. Die Granulationen werden mit Lapis geätzt. Einfacher Karbolverband.

Zu Ende des Monats schloß sich auch die 2. Fistelöffnung am Dorsum des Fingers. Aus der Volarwunde wird noch ein ungefähr $1\frac{1}{2}$ cm. langes, sehr dünnes Knochenstückchen extrahiert. Die Ueberhäutung nahm nun rasch zu. Patient bekam nur mehr eine Fingerschiene und wurde der Finger auf derselben in flektierter Stellung fixiert.

Anfangs Februar trat ein Borsalbeverband an Stelle des Karbolverbandes. Am 16. Februar konnte Patient als geheilt entlassen werden. Der Finger hatte seine natürliche Dicke wieder bekommen; er stand in gestreckter Stellung, die III. Phalanx war leicht flektiert und ulnarwärts abduziert; letztere Stellungsanomalie konnte durch eine auf der entgegengesetzten Seite angebrachte Schiene zwar etwas gebessert, aber nicht ganz gehoben werden. Beugebewegung des Fingers ist nicht möglich, da ja die Beugesehne nekrotisch zu Grunde ging. Im Verlauf der Heilung, die mehr als 2 Monate in Anspruch

nahm ist Patient niemals bettlägrig gewesen und war auch sein Allgemeinbefinden ein ganz vortreffliches.

II. Fall.

Bacher Philipp, 35 Jahre alt. Maurer. Patient wurde am 26. Januar 1884 als er sich gegen einen Betrunkenen wehren wollte, von demselben in den Daumen der rechten Hand gebissen. Er legte Senfpflaster auf die Wunde und arbeitete 2 Tage weiter, bis es ihm die Schmerzen unmöglich machten. Nach seiner Angabe trat gleich nach der Verletzung starke Schwellung des Handrückens und Unterarms ein, welche jedoch im Laufe der nächsten Tage zurückging. Patient konnte die ganze Woche nach erlittener Verletzung vor Schmerz nachts nur wenige Stunden schlafen und suchte deshalb die Poliklinik auf. In ärztlicher Behandlung ist er nicht gestanden.

Der Befund am 4. Februar war folgender: Am Dorsum des rechten Daumens findet sich in der Gegend des II. Interphalangealgelenks eine quer verlaufende 1—2 cm. lange Wunde mit glatten Rändern. Sowohl die II. Phalanx als besonders die I. zeigt starke Rötung und Schwellung am Dorsum, während in der Vola keine Schwellung sich findet. Drückt man auf das Dorsum der I. Phalanx, so entleert sich aus der Wunde eine Menge gelben, geruchlosen Eiters. Dabei hat Patient Schmerzen. Die II. Phalanx schmerzt weder spontan noch auf Druck.

Am selben Tage wurde in der Narkose eine Incision gemacht, die sich längs dem Ulnarrande des Daumens vom Metacarpo-phalangealgelenk bis zur Nagelwurzel erstreckte. Dabei zeigte sich die Strecksehne in ziemlicher Ausdehnung nekrotisch und stinkend, morische und lockere Sehnenfäden lagen in der Wunde, das Muskelfleisch war an einzelnen Stellen nekrotisch, die Haut war eine Strecke weit gegen den Handrücken und die Vola manus unterminiert, wie die Untersuchung mittelst der Kornzange ergab. Es wurden nun zwei Contraincisionen

gemacht, die Eine in der Gegend des I. Intercarbalgelenks, die Andere in der Vola längs des Daumenballens. Von jeder dieser Wunden aus wurde ein Drainrohr nach der Incisionswunde am Daumen geführt. Alle 3 Wunden wurden mit Jodoformgaze bedeckt; darüber kam ein feuchter Carbolverband. Die Hand wurde auf einer kleinen Schiene fixirt.

Patient hatte die Nacht nach der Operation nur mässige Schmerzen. Beim Verbandwechsel zeigte sich die Umgebung der Wunde reizlos. Das Jodoformgaze wurde in den Wunden belassen nur der Carbolverband darüber erneuert. Am 11. wird das von der Daumenwunde zur Dorsalwunde führende Drainrohr entfernt, am 14. auch das 2. Die Incisionswunde am Daumen zeigt gute Granulationen, ein grosser Teil des Sehngewebes ist im Begriff sich abzuheilen, doch scheint sich am Ulnarrand ein Faden der Sehne erhalten zu wollen. Patient ist vollkommen schmerzfrei.

Es wird nun jeden 3. oder 4. Tag das Jodoformgaze nach vorheriger Bepflanzung der Wunde mit Carbolsäure erneuert. Die Secretion der Wunden ist äusserst gering. Das Handbrett wird durch eine Daumenschiene ersetzt.

Am 1. März sind die beiden Contraincisionswunden geheilt. Die Wunde am Daumen ist in vortrefflichem Zustand, die Granulationen stehen in gleichem Niveau mit den Wundrändern, an mehreren Stellen hat die Ueberhäutung begonnen. Das Jodoformgaze wird nun weggelassen und Borfalbe tritt an seine Stelle.

Am 22. März wurde Patient geheilt entlassen. Der Finger ist schmerzlos, die Wunden haben sich geschlossen. Im Metacarpo-interphalangealgelenk ist active und passive Beweglichkeit nach jeder Richtung; im I. Interphalangealgelenk ist keine active Beweglichkeit, passiv ist die Streckbewegung gut, die Beugebewegung nur im geringen Grade möglich.

III. Fall.

Bauer Josef, 32 Jahre alt, Bahnaufseher. Patient trat am 27. Februar in Behandlung, nachdem er vor 4 Wochen bei einer Rauferei von einem andern Mann in den kleinen Finger der linken Hand gebissen war. Dieser Finger war in Folge eines vor längerer Zeit erlittenen Unfalls geschwellt und in flektirter Stellung geheilt. Nach der Angabe des Patienten sah man nach dem Biß zu beiden Seiten des Fingers, den Eindruck eines Zahnes, die Haut blieb unverletzt, Blutung trat keine ein. Mehrere Tage hatte der Patient keine Schmerzen. Im Laufe der nächsten Wochen brach an mehreren Stellen die Haut auf und in der letzten Zeit stellten sich heftige Schmerzen ein. Schwellung der Hand war nicht vorhanden gewesen. Patient hatte sich Carbolumschläge gemacht und war sonst nicht in Behandlung gewesen.

Als Patient am 27. Februar die Poliklinik aufsuchte, konnte folgender Befund aufgenommen werden: die I. Phalanx des kleinen Fingers der linken Hand ist kolossal verdickt, ebenso die II. Im I. Interphalangealgelenk ist Crepitation nachzuweisen. Die Haut des Fingers ist gerötet, livid gefärbt, an mehreren Stellen durchbrochen und zwar finden sich 4 solche Hautdefekte: einer an der Radialseite der I. Phalanx, einer an der Ulnarseite der II. Phalanx und zwei am Dorsum des Fingers dem II. Interphalangealgelenk entsprechend. Im Metacarpophalangealgelenk ist Bewegung vorhanden. Die Fisteln liefern ein stark stinkendes Sekret.

Patient erhielt einen einfachen feuchten Carbolverband und gingen bei dieser Behandlung einige Knochenstückchen durch die Fisteln ab und wurde das Sekret derselben weniger übelriechend. Mitte März entzog sich der Patient weiterer Beobachtung.

IV. Fall.

Ein 37 Jahre alter Tagelöhner wurde bei einer Rauferei am 11. Februar in den linken Daumen gebissen. Es trat

keine erhebliche Blutung ein, doch ziemliche Schwellung und mäfsiger Schmerz. Patient kam schon am nächsten Tage in die Poliklinik und fand sich bei der Untersuchung eine quer über das Dorsum des Daumengliedes laufende ungefähr 1 cm lange Wunde, aus welcher sich auf Druck eine geringe Menge Eiters entleeren liess, und in der Volarseite desselben Gliedes eine längsverlaufende Wunde, ebenfalls ungefähr 1 cm. lang. Daumen und Daumenballen waren geschwellt und gerötet. In die Wunde wurde Jodoform gestreut, darüber kam ein feuchter Carbolverband. Der Finger wurde auf einer Schiene immobilisiert. Schon 2 Tage später wurde einfach Borfalte angewandt, unter welcher Behandlung die Verletzung in 10 Tagen heilte.

Viel schwerer in ihrem Verlauf und in ihren Ausgängen sind die älteren über diesen Gegenstand veröffentlichten Fälle, von denen ich nun des Gegensatzes halber eine Anzahl hier anführe:

So erzählt Dr. Ebel in der Deutschen Zeitschrift für Staatsarzneikunde, 1855 folgenden Fall.

Am 22. Juni 1854 wurde ein sonst gesunder, kräftiger, 48 Jahre alter Schuhmacher von einem andern Mann in den kleinen Finger und Daumen der rechten Hand gebissen. Den kleinen Finger konnte er nicht gleich aus dem Gebisse seines Gegners frei machen, so dafs die Zähne erheblich tief eindrangen. Bei der Untersuchung fanden sich am 2. Glied des kleinen Fingers auf der oberen und unteren Seite des Gelenks 2 in transversaler Richtung verlaufende Wunden, dem Eindruck der Zähne entsprechend, jede $\frac{1}{4}$ Zoll lang und bis zur Beinhaut eindringend. Bereits am 26. Juni, als Patient in Behandlung trat, fand sich ein sehr hoher Grad von Entzündung, starke Geschwulst des Fingers über die ganze Hand bis zum Vorderarm, heftige Schmerzen, Schlaflosigkeit und starkes Fieber, so dafs Patient zu Bett liegen mußte. Trotz der Behandlung nahm die Entzündung und Schwellung zu, Eiterung

trat ein. Die brandige Zerstörung war besonders in der Volarseite des Fingers stark und erstreckte sich in die Tiefe bis auf das 2. und 3. Glied. Auch das Metacarpophalangealgelenk wurde brandig, weshalb die Absetzung des ganzen Fingers geboten war, welche denn auch am 8. Juli vorgenommen wurde. Der Rest der Gelenkbänder löste sich nur langsam durch Eiterung und stieß sich ab, worauf die völlige Vernarbung erst anfangs Oktober eintrat. Durch den Biss am Daumen der rechten Hand wurde der Nagel völlig abgelöst. Diese Wunde erstreckte sich nicht so tief, weshalb der Verlauf günstiger war und die Heilung schneller erfolgte.

Ein der *Gazetta medica italiana* (prov. Sarde) entnommener Fall von Bisswunde mit schweren Folgen ist in den Canstatter Jahresberichten von 1864 aufgezeichnet und möge hier seine Stelle finden:

Ein Mann von 29 Jahren wurde von einem Weibe in den 4. Finger gebissen; die III. Phalanx war von einem Chirurgen abgenommen, die II. nekrotisch geworden, die I. von allen Weichteilen entblößt, der 4. Metacarpalknochen nekrotisch, außerdem hatte sich die Entzündung fortgepflanzt bis zur Achselhöhle und bis zum obern und seitlichen Teil des Thorax derselben Seite, wo eiternde Wunden bestanden. Der 4. Finger mit dem Metacarpalknochen mußte exartikuliert werden und trat nach längerer Zeit vollkommene Heilung ein.

Drei ebenfalls sehr schwere Fälle, darunter einer mit tödlichem Ausgang wurden von Dr. Pribram in der Prager medizinischen Wochenschrift 1864 veröffentlicht und sollen hier wegen ihres interessanten Verlaufes wiedergegeben werden:

1. Fall. Ein 49 Jahre alter, gesunder Tagelöhner wurde von einem Manne in den linken Zeigefinger zu beiden Seiten des II. Phalangealgelenks gebissen. Er bemerkte am 2. Tage eine schmerzhaftige Schwellung des verwundeten Fingers, welche über Hand und Vorderarm sich ausbreitend, von der Wunde gegen den Ellenbogen hin eine schwärzliche Färbung annahm,

während auch an der normal gefärbten Haut unterhalb des Ellenbogens sich mehrere Oeffnungen bildeten, aus welchen bräunliche Eiter abfloß. Bei seiner Aufnahme in die Anstalt war Patient sehr hinfällig. Linkerseits war die Haut des Zeigefingers, des Handrückens, sowie die Streckseite des Vorderarms bis 3 cm. unterhalb des Ellenbogengelenks schwarz, gegen Berührung unempfindlich, stellenweise durchbrochen und von durchsickernder Jauche durchfeuchtet. An der Grenze des Brandschorfes war die noch erhaltene Haut geschwollen, livid, 5 cm unterhalb des Ellenbogengelenks an der Ulnarseite des Vorderarms befanden sich zwei erbsengroße Oeffnungen, aus welchen bei Druck Jauche und nekrotische Bindegewebsflocken sich entleerten. Nach Abtragung des abgegrenzten Brandschorfes lagen die Sehnen des Handrückens und die Aponeurose des Vorderarms von milchfarbigem Eiter bedeckt zu Tage. Als Verbandmittel wurde Charpie mit Calcar. chlorat. gebraucht, innerlich wurde Infus. Arnic. mit Aether. sulf. und Wein verabreicht. Am 24. Tage fiel der Zeigefinger mit Zurücklassung einer gut aussehenden Geschwürsfläche ab; die entblößte Dorsalfläche des Vorderarms zeigte sich ebenfalls mit guten Granulationen bedeckt. Obwohl eine nach der 7. Woche eintretende profuse Diarrhöe die Kräfte des Patienten sehr bedeutend schwächte, so besserte sich doch in der Folge das Allgemeinbefinden, die Geschwürsflächen verkleinerten sich und konnte der Verletzte 6 Monate nach erlittenem Unfall als geheilt entlassen werden, indem nur am Rücken der Hand und des Vorderarms 2 bohnergroße Geschwüre zurückblieben.

2. Fall. Ein 33 Jahre alter Kutscher war am 9. August 1864 von einem andern Mann in die innere Seite des linken Daumens gebissen. Erst am 5. Tage trat bedeutende schmerzhaftige Schwellung und Rötung erst der Hand, dann des ganzen Vorderarmes und bräunliche, später schwarze Färbung des verletzten Daumens ein.

Bei der Untersuchung am 26. August fand man den

ganzen linken Daumen schwarz, die Epidermis von jauchigem Serum blasig emporgehoben, die Haut des Handrückens livid gerötet, geschwellt, aus einzelnen Oeffnungen mifsfarbige Jauche nebst Gewebeflocken entleerend. In der Mitte des Vorderarms ging die Rötung und Schwellung der Haut allmählich in die normale Umgebung über. An der Vola zeigte sich deutliche Fluktuation, die Cubital- und Axillardrüsen waren wenig geschwellt, unschmerzhaft. Ausgiebige Incisionen an der Flachhand und dem Handrücken schafften der angefammelten Jauche freien Abfluß; hierauf war mit Aqu. chlorat. verbunden und Wein und Chinadekokt verabreicht. Am 5. September löste sich der mumifizierte Daumen aus dem Mittelhandgelenk ab. Die Haut an der Dorsofläche des Vorderarms und an der untern Hälfte des Oberarms floss sich vollständig los. Am 10. September erhielt der fieberlose Patient kräftige Kost, die gutaussehende Geschwürsfläche ward mit Arg. nitr. behandelt. Ohne nachweisbare Ursache traten am 20. September profuse Diarrhöen ein, und unter raschem Sinken der Kräfte und Verfärbung der Geschwürsflächen trat am 6. Oktober der Tod ein. Die Sektion erwies nichts Auffälliges, die Gefäße des Vorderarms waren vollständig durchgängig; pyämische Erscheinungen waren nicht vorhanden.

3. Fall. Ein 45 Jahre alter Mann war durch einen andern zu beiden Seiten des Interphalangealgelenks des rechten Mittelfingers gebissen worden. Am 2. Tage trat Schwellung desselben und der ganzen Hand ein, am 4. Tage war der Finger mifsfarbig und endlich schwarz. Am 7. Oktober, 16 Tage nach erlittener Verletzung war der rechte Mittelfinger bis zum ersten Fingergelenk schwarz, kalt, gefühllos, die Epidermis im ganzen Umfange durch bräunliches Serum blasig emporgehoben, von da bis zur Handwurzel war die Haut livid gerötet, geschwollen, an einzelnen Stellen fluktuierend. Am Handrücken über dem 3. Mittelhandknochen zeigte sich ein thalergröfses, unregelmäßig buchtiges Geschwür, dessen Grund von

der Streckfehne des 3. und 4. Fingers gebildet wurde. Entsprechend demselben waren in der Flachhand 2 bohngengroße Oeffnungen, aus denen stinkende, mit Bindgewebsetsen vermengte Jauche hervorquoll. Patient zeigte hochgradige Hinfälligkeit; Temperatur erhöht; Puls 90. Bis zum 12. Oktober war das 1. und 2. Fingerglied abgestossen und eine gut aussehende Geschwürsfläche zurückgeblieben. Am 18. Oktober ward die nekrotische oberflächliche und tiefe Beugefehne des Mittelfingers, welche aus der einen Fistelöffnung der Hohlhand hervorragt, entfernt. Am 29. Oktober konnte Patient wesentlich gebessert und außer Gefahr auf Verlangen entlassen werden.

Diess die Fälle, welche im Folgenden einer kurzen Betrachtung unterzogen werden sollen. Vorher will ich noch bemerken, daß ich in der neueren Literatur, insoweit sie mir zugänglich war, keinen in den Rahmen dieser Schrift passenden Fall gefunden habe, einen ausgenommen, der später Erwähnung finden wird.

Die Aetiologie der Wunden infolge von Menschenbiss ist im Worte selbst gegeben; am meisten werden diese Verletzungen bei Raufhändeln davongetragen und werden demgemäß bei männlichen, im kräftigen Mannesalter stehenden Individuen der niederen Volksklassen gewöhnlich beobachtet. Die gebissenen Teile sind durchweg die Finger, was einesteils in der Funktion dieser Körperteile, andernteils in deren Nichtgeschütztsein durch die Kleidung die genügende Erklärung findet.

Die Diagnose der Bisswunden als solche, dürfte wohl nur aus der Anamnese zu stellen sein, denn der Eindruck der Zähne am Wundrand bleibt wohl schwerlich so lange bis ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wird, was ja gerade in diesen Fällen bei ihrer anfänglichen scheinbaren Geringfügigkeit ziemlich spät zu geschehen pflegt. Und selbst wenn der Arzt gleich nach geschehener Verletzung an Ort und Stelle wäre, würde er die Zahneindrücke als von menschlichen

Zähnen herrührend, kaum sicher diagnostizieren können. Im allgemeinen kann man sagen, daß die spitzen Zähne der Raubtiere mehr Rißwunden erzeugen, indes die durch menschlichen Biß hervorgerufene Wunde dem Auge die Symptome der reinen Quetschwunde darbietet. Damit ist nun schon die Beantwortung der Frage vorweggenommen, unter welche Rubrik der Wunden die Menschenbißwunden zu bringen seien; doch glaube ich verlohnt es sich mit einigen Worten noch dabei zu verweilen.

Kommt ein Fingerglied durch irgend welche Veranlassung zwischen die Zähne eines Menschen und kontrahiert derselbe seine Masseteren, so wird der Finger zwischen den beiden Zahnreihen wie in einem Schraubstock oder wie zwischen 2 stumpfen Meißeln heftig gepreßt, gequetscht. In den meisten Fällen sieht man bei der ersten Besichtigung der Verletzung nach dem Biß eine kleine höchstens 1—1½ cm lange Wunde, deren Ränder meist ziemlich gerade verlaufen, aber verdickt und geschwollen sind und eine dunkelblaurote Verärbung zeigen; Blutung ist keine da, war auch nur sehr gering oder fehlte überhaupt ganz, kurz man hat die Symptome der Quetschwunde. Es kann aber auch, wie in Fall III, die Haut in ihrer Kontinuität erhalten geblieben sein, dann sprechen wir eben nicht von Quetschwunde sondern von Quetschung. Die quetschende Gewalt ist ihrer Intensität nach natürlich nicht immer dieselbe. In einigen Fällen dringt der Biß gleich bis zum Periost, so in Fall I und in dem von Ebel erzählten Fall, ein andermal wird nur eine geringe Hautverletzung gesetzt, wie in Fall IV. Mit welcher enormer Gewalt die Masseteren wirken können, beweist ein Fall, den Eulenburg im 14. Bande seiner Encyclopaedie erwähnt: einem Droschkenkutscher wurde im Streite von einem Fahrgast das letzte Daumenglied total abgebißen und die Sehne herausgerissen, so daß also mit der Quetschung noch Ausreißung kombiniert war. Im allgemeinen muß man sich bei den Bißwunden

sehr hüten, die Schwere der Verletzung nach der Extensität der Wunde zu beurteilen, denn bei nur geringer oder selbst ganz fehlender Verletzung der äußeren Bedeckung, können doch in der Tiefe die weitgehendsten Zerstörungen stattgefunden haben, so daß also die Wunde an und für sich von viel weniger Belang ist als ihre Folgen, was früher noch viel mehr der Fall war als heutzutage.

Wenn wir zunächst, abgesehen von den jüngst beobachteten Fällen, die älteren in ihrem Verlaufe verfolgen, so finden wir bei denselben nach einigen Tagen Veränderungen schlimmster Natur auftreten: starke Schwellung, Eiterung, Verjauchung, Gangrän; nicht genug, daß die ganze Extremität in den deletären Prozeß hineingezogen ist, pflanzt sich in dem einen Fall dieser Prozeß bis auf den Thorax fort und wir lesen von eitrigen Geschwüren an demselben. Die Patienten sind dabei in ihrem Allgemeinbefinden höchlichst alterirt, liegen mit fliegendem Puls, hohem Fieber zu Bett, werden durch profuse Diarrhöen noch weiter geschwächt und in diesem desolaten Zustand tritt bei einem der Fälle sogar der Tod ein. In den andern günstig verlaufenden Fällen kommt es zu einer Demarkation des Gangränösen, der gebissene Finger und der eine oder andere Metakarpalknochen dazu stoßen sich ab oder werden vom Chirurgen abgenommen und nach einer über Monate sich hinziehenden mühsamen lokalen und allgemeinen Behandlung wird der Patient, der noch ein paar geschwürige Stellen an Handrücken oder Unterarm trägt, als geheilt entlassen. So das gemeinfame traurige Bild dieser Fälle.

Man glaubte nun, daß die kleinen ursprünglichen Wunden an sich unmöglich diese schweren Folgezustände herbeiführen könnten und meinte, es müsse ein gewisses, unbekanntes Etwas die Schuld daran tragen. Und so verfiel man darauf, dem in die Wunde gebrachten Speichel eine besonders schädliche Wirkung zu vindicieren und ihn für den schweren Verlauf der Verletzung verantwortlich zu machen. Noch im Jahre 1866

ipricht Dr. Ritter in der deutschen Zeitschrift für Staatsarzneikunde über diesen Gegenstand folgende Ansicht aus, indem er für dieselbe besonders in den 3 Prager Fällen eine Stütze zu finden glaubt:

»Durch den Biss von zornentbrannten Menschen und Tieren wird ein in seiner Konstitution veränderter Speichel in die Wunde eingeführt, der teils direkt, teils indirekt eine potenzierte dynamische Wirkung auf das Blut äußert, teils vermöge der Diaftase, einen der Verdauung ähnlichen Prozefs, dessen Produkte auf sekundäre oder primäre Weise dem Blute mitgeteilt, ändernd auf dessen Mischung einwirken und unter diesen Verhältnissen von der Wunde aus allgemeine Erscheinungen ins Dasein rufen, welche mit jenen vergifteter Wunden die grösste Aehnlichkeit haben.«

So Ritter und mit ihm sprachen viele dieselbe Ansicht aus und nicht bloß als Mutmaßung, sondern als unumstößliches und unangreifbares Faktum, ich nenne nur Casper in Deutschland und Vidal in Frankreich. Aber wie so oft in der Geschichte der Medizin, so ist es auch hier; diese vor noch nicht einmal 20 Jahren gültige Lehre ist als gänzlich unhaltbar aufgegeben und für „eine potenzierte dynamische Wirkung des Speichels auf das Blut“ haben wir nur mehr ein mitleidiges Lächeln. Die Physiologie lehrt wohl, daß die Speichelfekretion vom Nerveneinfluß abhängig ist, aber eben nur die Sekretion ihrer Quantität nach; daß durch eine Gemütsaffektion wie Zorn im Speichel oder einem andern menschlichen Sekrete ein spezifischer Giftstoff hervorgebracht werde, davon kann keine Rede mehr sein und fällt uns die Vorstellung schwer, daß noch vor relativ so kurzer Zeit eine solche Ansicht ziemlich allgemein als richtig anerkannt wurde. Denn auch damals war die Lehre vom Zorngift nicht ohne Gegner. Bardeleben erklärte dieselbe für hypothetisch und Krahmer bezweifelte sie ebenfalls, meinte aber es läge am nächsten, die schweren Folgen nach Bißwunden durch Einimpfung bereits in Zer-

fetzung begriffener Speiserefte oder vegetabilischer Gifte, wie Nikotin, zu erklären. Was das Letztere anlangt, so wird von einigen Forschern (Vohl und Eulenberg) das Vorkommen von reinem Nikotin im Tabaksrauch überhaupt in Abrede gestellt; es finden sich nach diesen in demselben nur die viel schwächer wirkenden Zerfetzungsprodukte des Nikotin vorzugsweise Pyridinbasen. Aber selbst, wenn wirklich reines Nikotin im Tabaksrauch vorkäme, wie Heubel annimmt, so ist die Menge desselben doch so minimal, daß von einer durch sie hervorgebrachten giftigen Wirkung nicht die Rede sein kann. Zugestanden aber es gelangten selbst größere Quantitäten reinen Nikotins durch den Biß in die Wunde, so müßten doch die diesem Alkaloid eigentümlichen Allgemeinwirkungen auftreten, wir lesen aber in keinem Falle von Zittern der Extremitäten, klonischen Krämpfen der Atemmuskeln, Amaurose und ähnlichen Erscheinungen, die bei Nikotinvergiftung auftreten.

Speiserefte endlich, werden wohl überhaupt selten in die Wunde gebracht, da sie ja an den die Wunde gewöhnlich verursachenden Schneidezähnen nicht leicht haften, sondern vielmehr auf den höckerigen Kronen der Molar und Buccalzähne; dann werden sie auch leicht durch die Blutung oder das Auswaschen der Wunde weggespült.

Sollten aber wirklich einzelne in Zerfetzung verbliebene Speisepartikelchen in der Wunde verblieben sein, so sind dieselben allerdings im Stande eine Infektion derselben hervorzurufen; es verhält sich dann der Zahn, der diesen infizierenden Körper in die Wunde bringt, nicht einfach wie ein stumpfer Meißel, sondern wie ein in Jauche getauchtes Instrument; und wie beim Katheterisieren mit unreinen Instrumenten der Urin in der Blase sich zersetzt, so rufen auch hier die fauligen Substanzen eine Zerfetzung der bei Quetschwunden besonders reichlich vorhandenen Wundsekrete herbei. Diese lokale septische Affektion nun hat eine Zellgewebsentzündung, eine septische

Phlegmone im Gefolge, deren Produkte wiederum sich leicht zersetzen und schliesslich zu Eiterung und Gewebstnekrose führen, falls Patient nicht an der unvermeidlichen Blutvergiftung zu Grunde geht. Die septische Infektion ist also die Hauptsache bei dem Prozesse. Dieselbe müsste nun nach dem Gesagten in allen Fällen von in Zersetzung begriffenen Speisereften herühren. Dies ist aber durchaus nicht notwendig; man weiss, dass die in der Luft suspendierten kleinsten organischen Körperchen für sich allein vollständig genügen jene zunächst für die Wunde bald aber für den ganzen Organismus so deletären Folgen herbeizuführen; finden ja doch die Bacillen in den Wundsekreten sowie auf den durch die Quetschung abgestorbenen Gewebsteilen den günstigsten Nährboden. Sind nun zufällig noch zersetzte Speiserefte in die Wunde gekommen, so ändert das nichts an der Sache. In jedem Falle erfolgt eine rapide Vermehrung der unter so guten Ernährungsbedingungen stehenden organischen Fäulnisserreger, der Spaltpilze, und daran sich schliessend ein rapider Fortschritt des zur Eiterung und Nekrose führenden Entzündungsprozesses mit seinen Gefahren für den Gesamtorganismus. So verstehen wir leicht die schweren geschilderten Krankheitsbilder, so wissen wir auf was wir den tödlichen Ausgang im 2. Prager Fall zurückzuführen haben und brauchen nicht mehr nach spezifischen Giftstoffen im Speichel zu suchen; die spezifischen infizierenden Stoffe sind eben die aus der Luft stammenden Spaltpilze, welche, wie bereits erwähnt, in Quetschwunden besonders gut gedeihen.

Wenden wir uns nun zu den zuerst beschriebenen Fällen. Hier ist weder von erschöpfender Eiterung noch von weitgehender Verjauchung und Nekrose die Rede, sämtliche Patienten waren niemals bettlägerig, waren in ihrem Allgemeinbefinden durchaus nicht gestört.

Was ist die Ursache dieses grellen, aber so erfreulichen Gegensatzes mit älteren derartigen Fällen einzig und allein die Behandlung, sie ist es, die einen solchen Gegensatz erst schafft,

denn, wenn wir genau zusehen, war ein solcher anfänglich gar nicht vorhanden, es war in Fall I, II und IV Schmerz, starke Schwellung und Eiterung vorhanden, als die Patienten in Behandlung traten, gerade so wie bei den älteren Fällen, und bei Fall I besonders hatte es keines sehr langen Zuwartens mehr bedurft, um ein Pendant zu einem der Prager Fälle zu bekommen. Fall III kann hier nicht in Betracht kommen, es handelt sich ja bei demselben nicht um eine Wunde, sondern bei erhaltener Haut ist hier der Knochen durch die Gewalt der Quetschung getötet worden, wir haben eine Drucknekrose.

Um also den schweren Folgen der Bisswunden vorzubeugen, kam es darauf an, Mittel und Wege zu finden, der Wundinfektion von vornherein vorzubeugen, oder wenn eine solche bereits vorhanden, dieselbe möglichst zu beschränken. Diese Mittel hat uns nun Lister mit seiner Methode an die Hand gegeben, eine Methode, welche wie bei so vielen Fällen anderer Art, auch bei den hier abgehandelten Verletzungen sich glänzend bewährt und die Gefahren derselben in hohem Grade vermindert hat.

Die Wundinfektion von vornherein abzuhalten ist bei den Menschenbisswunden sehr selten möglich und zwar liegt dies einerseits an der Art der Verletzung, andererseits an den Patienten. Die scharfen Ränder der Schnittwunden legen sich gewöhnlich glattaneinander und bilden so eine schützende Decke, welche vor von außen eindringenden Körpern irgend welcher Art einen gewissen Schutz gewährt, während die weniger scharfen Ränder der Bisswunden keine Neigung haben, sich aneinanderzulegen, ferner ist gewöhnlich durch die quetschende Gewalt ein kleineres oder größeres Hautstückchen nekrotisch geworden; Beides Momente, welche eine Infection begünstigen und einer primarunion im Wege stehen. Andererseits wird auch von den von Menschen Gebissenen die Wunde gewöhnlich sehr vernachlässigt, Leute, welche von Hunden gebissen werden, gehen gewöhnlich rasch zum Arzt aus Furcht vor dem Gift der Hundswut, ebenso

fäumen Leute, welche von Schlangen gebissen werden, gewöhnlich nicht sich in Behandlung begeben und Bisse von Pferden oder anderen gröfseren Tieren führen die Patienten schon durch die Gröfse der Verletzung rasch zum Arzt. Die kleinen von den menschlichen Zähnen herrührenden Wunden werden aber anfänglich gar nicht beachtet, sie werden höchstens ausgewaschen, dann aber nicht weiter rein gehalten, die gewöhnliche Arbeit wird fortgeführt, bis endlich in der so maltrairten Wunde und deren Umgebung Schmerzen sich einstellen und rasch zunehmende Schwellung auftritt. Kommen die Verletzten mit einem solchen Zustande ihrer Wunde in Behandlung, so soll man sofort daran gehen, die inficierte Wunde von den septischen Substanzen zu befreien und eine energische Desinfection vorzunehmen. Man macht zu diesem Zweck einen dreiften Einschnitt am besten der ganzen Länge des Fingers nach und übersieht nun, in welchem Grad die Gewebe unter der Haut zerstört sind. Es wird dann das Nekrotische — wenn nötig mit dem scharfen Löffel — entfernt, wobei man aber darauf achten muß, nicht etwa gefundes Sehngewebe zu zerstören, so blieb in Fall II nur ein kleiner Sehnenfaden erhalten, der aber hinreicht, dem Manne die Beweglichkeit seines Fingers zu erhalten. Weiter sieht man, ob der deletäre Proceß sich auf die nächste Umgebung der Wunde beschränkt hat, oder ob er sich auf eine gröfsere Ausdehnung erstreckt; sehr gewöhnlich ist die Eiterung in den Sehnencheiden oder Muskelinterstitien weiter gekrochen und ist man oft genötigt, solche Gänge der Länge nach zu spalten, in der Regel aber genügt es an den für den Abflufs des Sekretes günstigsten Stellen Contraincisionen zu machen und ein paar Drainröhren einzulegen. Manchmal ist es nötig, auch ohne dafs Eitergänge vorhanden sind, Incisionen zu machen zur Entlastung bei starker Schwellung wie in Fall I. Nach Entfernung des Nekrotischen wird die Wunde mit Chlorzink und Jodoform desinficiert und damit ist die Hauptarbeit gethan.

Mit diesem Verfahren soll man aber durchaus nicht zögern, denn jeder Tag Warten bringt den Patienten mehr in Gefahr, es wurde auch in Fall I und II mit dem Incidieren nicht gezögert. Im Fall III war keine Phlegmone da, und eine Veranlassung zum operativen Eingreifen nicht gegeben und ist die Annahme gestattet, daß hier die Knochen vorzugsweise von der Quetschung getroffen wurden, insofern die Sehnen und Sehnencheiden, von denen der phlegmonöse Proceß seinen Ausgang gewöhnlich nimmt, weniger stark gelitten hatten. Die weitere Behandlung war von sämtlichen Fällen eine sehr einfache. Die Wunden wurden täglich durchgespült und ein neuer Verband angelegt. Als desinfizierende Lösung wurde 1½-prozentige Carbollösung angewandt, im Uebrigen wurde noch Jodoformpulver in die Wunden gestreut. Als dieselben nahezu geschlossen waren wurde der Carbolverband durch einen einfachen Borfabeverband ersetzt, unter welchem die schließliche Heilung erfolgte. Das gebissene Glied wurde auf einer Schiene immobilisiert. Dies ist die einfache Therapie, welche für alle derartigen Fälle zu empfehlen ist. Die Patienten wurden ambulant behandelt und war neben dem lokalen ein innerliches therapeutisches Eingreifen nicht erforderlich.

Die Ausgänge dieser Verletzungen sind — das antiseptische Verfahren vorausgesetzt — abhängig davon, welche Gewebepartien von der Quetschung lüdiert wurden, ob Haut, Sehne, Knochen oder alle zusammen. In Fall IV war blos eine Hautwunde gesetzt, die bald geheilt war. In Fall III ist, wie bereits erwähnt, hauptsächlich der Knochen afficiert, einzelne Teile desselben kamen durch die Fistelöffnungen zum Vorschein und wird, wenn sämtliche Sequester entfernt sind, Heilung eintreten, ohne an dem bereits verstümmelten Finger eine wesentliche Veränderung hervorzubringen. In Fall II waren Haut und Sehne nekrotisch geworden, der Knochen aber intakt geblieben, ein kleiner Sehnenfaden hatte sich erhalten und diesem Umstand verdankt Patient die Beweglichkeit seines

Daumens. Dafs dieselbe aktiv noch nicht vorhanden und passiv besonders beim Beugen erschwert ist, hat seinen Grund in der langen Immobilisation des Gliedes im Verband. Massage und Uebung im Bewegen wird, wenn auch erst nach längerer Zeit, die alte Beweglichkeit wieder herstellen. Der I. Fall endlich war der schwerste; hier waren Haut Sehne und Knochen durch die quetschende Gewalt mortificirt, und das eröffnete Interphalangealgelenk communicierte durch Fistelöffnungen mit der Dorsal- und Volarseite des Finger. Auch hier trat Heilung ein, die Fisteln schlossen sich, die nekrotischen Knochenteile stiefsen sich ab, der Finger nahm daher auch sein natürliches Volumen wieder an, aber die Beugesehne war eben zu Verlust gegangen, er blieb steif. Patient, ein Hausknecht, wurde dadurch in seinem Beruf nicht erheblich gestört; bei manchem Handwerk ist aber ein steifer Finger absolut hinderlich und es kommt die sekundäre Exartikulation in Frage, welche auch im Metacarpophalangealgelenk nach der Ovalärmethode leicht ausgeführt werden kann. In solchen Fällen könnte man natürlich gleich anfangs exartikulieren, allein die Patienten geben eben gewöhnlich erst dann ihre Einwilligung zur Operation, wenn sie einsehen, dafs der steife Finger sie erwerbsunfähig macht. Auch in solchen Fällen dürfen wir mit dem Resultat der Behandlung sehr zufrieden sein, eine abgestorbene Sehne, ein nekrotisches Knochenstück kann auch das antiseptische Verfahren nicht herstellen, daselbe leistet genug, indem es den Kranken vor den Gefahren, welche eine septische Wunde in ihrem Gefolge hat, bewahrt, so dafs der Allgemeinzustand des Patienten nicht im Geringsten alteriert ist und derselbe weder Schmerz noch überhaupt ein Krankheitsgefühl hat. Wir haben gelesen, wie früher derartige Verletzungen verliefen und Billroth sagt mit Recht »ein Chirurg, der niemals eine aseptisch verlaufende bedeutendere Quetschwunde gesehen hat, kann sich von den Resultaten der modernen Behandlung keine Vorstellung machen«.

Die Dauer der Heilung ist bei diesen Fällen, wenn die Verletzung nicht eine ganz geringfügige ist, immerhin eine beträchtliche. In Fall II, der als ein Fall mittlerer Schwere gelten kann, erforderte die vollständige Ausheilung ungefähr 7 Wochen. Im Allgemeinen glaube ich kann man 6—8 Wochen als Durchschnittsdauer der Heilung angeben.

Die Prognose kann bei dem jetzigen antiseptischen Verfahren, wenn anders die Patienten nicht allzuspät in Behandlung treten quoad vitam absolut günstig gestellt werden. Denn, wenn auch noch einzelne Todesfälle bei Quetschwunden durch Pyaemie vorkommen, wie Volkmann einen solchen vom Jahre 1875 aus der Halle'schen Klinik berichtet, so ist das doch extrem selten und kann die Prognose nach dieser Richtung hin nicht trüben. Quoad funktionem liegt die Sache nicht so gut, denn einmal macht die lange Zeit beanspruchende Heilung den Patienten lange arbeitsuntüchtig und ferner bleibt bei den einigermaßen erheblichen Verletzungen derart ziemlich häufig ein Fingerglied oder der ganze Finger steif, so daß der Verletzte dadurch in seinem Beruf gestört oder gänzlich gehindert sein kann, und eventuell die Abtragung des Fingers noch nachträglich notwendig wird.

Diese auf Grund der gesammelten Fälle gemachten Bemerkungen können wir nun in Folgendem kurz zusammenfassen: Die Wunden in Folge von Menschenbiss gehören unter die Rubrik der Quetschwunden, von einem spezifischen, durch den Zorn im Speichel erzeugten Giftstoff ist keine Rede; bei antiseptischem Verfahren ist eine Gefahr für das Leben nicht vorhanden; die Heilung nimmt zwar einen langsamen aber guten, für das Allgemeinbefinden in keiner Weise schädlichen Verlauf; das verletzte Glied bleibt aber unter Umständen auf die Dauer in seiner Funktion beeinträchtigt.

Am Schluss der Arbeit sage ich Herrn Professor Dr. Helferich für die gütige Ueberlassung der Fälle meinen Dank.
